


AU sein d'une structure

d'exercice coordonné . CPTS / MSP / ESP / MMG...

Le
PATIENT



Centre infectieux de référence
Orientation / conseil

GRAVITE *

*Signes de comorbidités :

- Pneumopathies hypoxémiantes oxygène-requérante,
- Terrains fragiles,
- Comorbidités respiratoires à risque de décompensation,
- Insuffisance rénale dialysée,
- Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV,
- Cirrhose ≥ stade B,
- Diabète insulino-dépendant ou requérant compliqué,
- Patient immunodéprimé

Retour à domicile
avec surveillance par l'IDEL

NON

OUI

En phase II :
test

COMORBIDITES *

NON

OUI

Isolement à domicile

suivi par IDEL

TC toutes les 48h.

Envoi de l'ordonnance à la pharmacie
par Messagerie sécurisée et livraison au patient

Celle du patient

Ou celle du pool IDEL

SAMU

Hôpital

* Signe de gravité :

- Dyspnée de repos,
- Polypnée,
- Tirage,
- Troubles de l'élocution,
- Sueurs, Cyanose,
- Crépitants,
- Sat O2 <90 %

Pool d'infirmières volontaire
libérales (sur jours de congés ...)